# Virusolve®+

## Sporobójcza dezynfekcja wysokiego poziomu i mycie wyrobów medycznych oraz KAŻDEJ powierzchni

Gwarancja ochrony i wydajności.
Całkowita kontrola zakażeń - bezpieczeństwo.

**Podstawowe korzyści, jakie daje VIRUSOLVE+:**

- ✓ Sporobójcza dezynfekcja wysokiego poziomu i mycie
- ✓ Nie zawiera chloru, aldehydów, kwasu nadoctowego
- ✓ Skuteczny przeciw sporom bakterii: *Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus cereus i Bacillus subtilis*
- ✓ Skuteczny w szerokim zakresie patogenów, w tym prątków, wirusów, bakterii, grzybów, drożdży i pleśni, w tym MRSA, HBV, HCV, HIV
- ✓ Skuteczny wobec trudnych do usunięcia wirusów bezosłonkowych Polio, Adenowirus, Norowirus
- ✓ Nie utrwala zanieczyszczeń
- ✓ Spełnia wymagania normy EN14885 Faza II Etap II
- ✓ Nie powoduje korozji - nie uszkadza delikatnych powłok
- ✓ Nie wymaga aktywatora
- ✓ Ekonomiczny w użyciu
- ✓ Bez oparów

MCPOLSKA.PL
Lider w szybkiej dezynfekcji sporobójczej
Zakażenia pod kontrolą

# Virusolve®+

## Sporobójcza dezynfekcja wysokiego poziomu i mycie wyrobów medycznych oraz KAŻDEJ powierzchni

## Informacje ogólne

Virusolve+ koncentrat jest opatentowanym płynnym preparatem do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu. Kombinacja składników aktywnych, w tym poliaminy nie zawiera toksycznych aldehydów, związków uwalniających chlor, kwasu nadoctowego i nie wymaga aktywatora. Virusolve+ zapobiega ryzyku przenoszenia zakażeń krzyżowych z powierzchni i wyrobów medycznych, powodowanych przez spory, prątki, bakterie, wirusy (osłonkowe i bezosłonkowe) oraz grzyby. Virusolve+ nie tylko hamuje rozwój drobnoustrojów, ale też niszczy ich materiał genetyczny. Produkt jest bezpieczny dla metali, szkła i tworzyw sztucznych, posiada delikatny zapach (Neutralny, Lawenda, Orchidea). Wyrób medyczny klasy IIb.

## Opakowania

**Koncentrat:**
o zapachu neutralnym:
2,5L: 5L ; 25L ; 210L
o zapachu lawendowym:
1L; 5L
o zapachu orchidei:
1L
o zapach cytrynowym:
5L

**Gotowy do użycia:**
Spray 750 ml
Kanister 5L

## Właściwości

| | VIRUSOLVE+ 5% | Czas |
|---|---|---|
| Spory | **EN13704** | |
| | *Clostridium difficile* | 2 min |
| | *Bacillus subtilis* | 5 min |
| | **EN14347** | |
| | *Clostridium difficile, Clostridium perfringens* | 1 min |
| | *Bacillus cereus* | 1 min |
| Prątki | **EN14348** | |
| | *Mycobacterium tuberculosis* | 5 min |
| | **EN14563** | |
| | *Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium* | 5 min |
| Bakterie | **EN1276, EN13727** | 1 min |
| | **EN14561** | |
| | *Staphylococcus aureus* | 1 min |
| | *Pseudomonas aeruginosa, Enterococcis hirae* | 1 min |
| Wirusy | **EN14476** | |
| | Polio, Adeno, Noro, SARS | 5 min |
| | HIV, HBV, HCV | 1 min |
| Grzyby i drożdże | **EN1650** | 2 min |
| | **EN13624** | 5 min |
| | **EN14562** *Candida albicans, Aspergillus niger* | 1 min |

## Sposób użycia

**Powierzchnie i wyposażenie medyczne:**

Dezynfekcja niskiego poziomu: Rozcieńcz koncentrat z wodą do stężenia roztworu 0,5% (5 ml + 995 ml wody = 1 litr roztworu roboczego). [15 min]
Dezynfekcja średniego poziomu: Rozcieńcz koncentrat z wodą do stężenia roztworu 2,5% (25 ml + 975 ml wody = 1 litr roztworu roboczego). [15 min]
**Sporobójcza dezynfekcja wysokiego poziomu**: Rozcieńcz koncentrat z wodą do stężenia roztworu 5% (50 ml + 950 ml wody = 1 litr roztworu roboczego).[5 min]
Rozcieńczony roztwór nanieś bezpośrednio na powierzchnię i delikatnie przetrzyj ściereczką, która nie pozostawia włókien.
Zachowaj odpowiedni czas kontaktu preparatu na powierzchni. Przemyj powierzchnię wodą, jeśli jest to wymagane (np. inkubatory, kauczuki, elastomery, PCV).
Koncentrat zmieszany z wodą (niezanieczyszczany), jest aktywny tak długo, jak termin ważności koncentratu, z którego został przygotowany.

**Krok 1:**
W razie potrzeby umyj narzędzia w preparacie z grupy VIRUZYME, VIRUDET N i opłucz wodą.
Do nawilżania i transportu narzędzi na mokro, zalecamy preparaty PREGEL lub PREFOAM.

**Krok 2:**

*Odmierzoną ilość koncentratu Virusolve+ wlej do wcześniej odmierzonej ilości wody i wymieszaj. Roztwór jest gotowy do użycia. Stężenie: 5% (50 ml + 950 ml wody = 1 litr roztworu roboczego).*




*Włóż narzędzia do wanienki. Upewnij się, że narzędzia zostały całkowicie zanurzone i wypełnione roztworem. Odczekaj zalecany czas kontaktu 5 min**

*Zdezynfekowane narzędzia wyjmij z roztworu i dokładnie opłucz pod bieżącą wodą. Następnie osusz sterylnym materiałem i poddaj dalszym procesom higienicznym – jeśli wymagane.*

Virusolve+ wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywność musi być kontrolowana paskami testowymi QuantofixQuat lub VIRUTEST Koncentrat. Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni.
* W przypadku, gdy twardość wody przekracza 300 ppm, zalecany czas dezynfekcji narzędzi to 10 min.

Zastosowanie: przez przetarcie, zanurzeniowo manualnie i w myjkach ultradźwiękowych.
Termin ważności preparatu: 3 lata od daty produkcji. Temperatura magazynowania: 5-40$^{0}$C.

amity international · HEALTHCARE ·

Amity International,
Libra House, West Street,
Worsbrough Dale,
Barnsley, S70 5PG, UK

UK Tel: 0845 3707700
Int Tel: +44 (0) 1226 770787
Email: sales@amityinternational.com
www.amityinternational.com

MCPOLSKA.PL
Lider w szybkiej dezynfekcji sporobójczej
Zakażenia pod kontrolą

**Wyłączny importer w Polsce:**
MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. Sp. komandytowa
62-080 Swadzim, ul. Wschodnia 5a
tel./fax. **61-822-65-61** e-mail: biuro@mcpolska.pl
www.mcpolska.pl www.virusolve.pl

CE 1639

Data aktualizacji 30.12.2019 r.