

# Softasept® N



Dezynfekcja skóry

- Szerokie spektrum bójcze
- Wiele możliwości zastosowania
- Bardzo dobra tolerancja
- Przedłużony czas działania 24 do godzin
- Możliwość stosowania u noworodków i niemowląt

# Softasept® N

Alkoholowy preparat do dezynfekcji / dezynfekcji i zabarwiania przedoperacyjnej i przedzabiegowej skóry.

## Właściwości

- Przedłużony czas działania do 24 godzin.
- Brak negatywnego działania na proces gojenia ran
- Możliwość stosowania na skórę noworodków i niemowląt
- Wysoka aktywność również w sytuacji obciążenia biologicznego, czyli obecności krwi, białka, surowicy
- Szybkoschnący
- Skuteczny, zapewnia właściwe przyleganie folii stosowanej podczas zabiegów operacyjnych i posiada dobre właściwości odłuszczone
- Wersja barwiona do zaznaczenia pola operacyjnego
- Szerokie spektrum działania obejmujące aktywność
- Bardzo dobrze tolerowany przez skórę, przebadany dermatologicznie, brak dodatkowych substancji minimalizuje ryzyko wystąpienia podrażnień i reakcji alergicznych

## Zastosowanie

- Przedoperacyjna dezynfekcja skóry.
- Dezynfekcja i zaznaczanie pola operacyjnego – wersja Softasept N barwiony
- Dezynfekcja skóry przed
  - biopsjami,
  - punkcjami,
  - pobieraniem krwi,
  - zastrzykami,
  - cewnikowaniem żył
  - zdejmowaniem szwów chirurgicznych,
  - zaopatrywaniem ran

- Do zastosowania wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny. Produktu leczniczego nie należy rozcieńczać. Nierozcieńczony preparat Softasept N niezabarwiony nanieść na skórę i rozprowadzić jałowym gazikiem. Odkazaną powierzchnię skóry należy dokładnie zwilżyć produktem, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Nadmiar produktu zebrać wacikiem.
- Czas działania: 15 sekund. Przy zabiegu typu nakłucie stawu lub jamy ciała zawierającej płyn – czas działania 1 minuta.
- Nie stosować urządzeń elektrycznych, np. elektrod na skórę wilgotną.

## Skuteczność mikrobiologiczna

Bakterie (w tym Tbc), grzyby	15 s
Wirusy otoczkowe (HCV, HBV, HIV, Vacina)	15 s
E. coli	30 s
Rotawirus	60 s
Poliowirus	5 min

## Dostępne opakowania

## Numer katalogowy

### Softasept® N bezbarwny

butelka o poj. 250 ml z atomizerem	18334
butelka o pojemności 1000 ml	18335
kanister o pojemności 5 L	18336
atomizer do butelki o poj. 1000 ml	3908012

### Softasept® N zabarwiony

butelka o poj. 250 ml z atomizerem	18337
butelka o pojemności 1000 ml	18338
Kanister o pojemności 5 L	18339
atomizer do butelki o poj. 1000 ml	3908012

## Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na etanol, 2-propanol, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nie stosować leku doustnie.

## Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Lek łatwopalny. Pojemnik powinien być szczelnie zamknięty.

Okres ważności w nienaruszonym opakowaniu 5 lat, po pierwszym otwarciu opakowania 12 miesięcy (nie dłużej niż okres ważności podany na etykiecie)

## Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

### Softasept N barwiony

Świadectwo Rejestracji nr 11413/M/99  
Nr pozwolenia 13024

### Softasept N bezbarwny

Świadectwo Rejestracji nr 111656/M/99  
Nr pozwolenia 13014

## Softasept® N – skład

100 g zawiera: 78,83 g etanolu (96%), 10,0g 2-propanolu, wodę oczyszczoną. W wersji barwionej dodatkowo: azorubina, żółcień pomarańczowa.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun Straße 1, D-34212 Melsungen, Niemcy