Tabela 1

nr na mapie	takson [nazwa łacińska]	takson [nazwa polska]	obwód pnia [cm]	obwód pnia u podstawy [cm]	średnica korony [m]	powierzchnia krzewu/grupy [m2]	uwagi / opis	zły stan	po-susz	jemioła	pochy-lenie pnia	zalecenia
3	*Rhus typhina*	sumak octowiec	76	–	5	–	*pomiar wykonany na wysokości 110 cm; korona nieznacznie asymetryczna, silnie przerzedzona; posusz w koronie około 30%; pień nieznacznie pochylony; na wysokości około 150 cm pień rozwidla się na dwa nierównorzędne przewodniki; w miejscu rozwidlenia ślad po trzecim przewodniku o śr. około 10 cm; na całej długości przewodnika widoczne odwarstwienia kory; drzewo zamiera	**tak**	30%	nie	tak	do usunięcia ze względu na zły stan sanitarny
4	*Larix decidua*	modrzew europejski	66	–	5	–	korona nieznacznie asymetryczna, silnie przerzedzona; posusz około 30%; ślady po wyłamanych pędach; na pniu liczne pędy odroślowe drobne; niska wartość walorów estetycznych i kompozycyjnych	**tak**	30%	nie	nie	pielęgnacja (poprawa warunków glebowych; redukcja suchych pędów)
5	*Larix decidua*	modrzew europejski	63	–	4,5	–	korona silnie przerzedzona; posusz około 30%; niska wartość walorów estetycznych i kompozycyjnych	**tak**	30%	nie	nie	pielęgnacja (poprawa warunków glebowych; redukcja suchych pędów)
N4	*Gleditsia triacanthos*	gleditzja trójcierniowa	16	–	2,5	–	drzewo młode, zdrowe	**nie**	0%	nie	nie	do przeniesienia ze względu na kolizję z inwestycją
N5	*Gleditsia triacanthos*	gleditzja trójcierniowa	16	–	2,5	–	drzewo młode, zdrowe	**nie**	0%	nie	nie	monitoring
N6	*Gleditsia triacanthos*	gleditzja trójcierniowa	16	–	2,5	–	drzewo młode, zdrowe	**nie**	0%	nie	nie	monitoring
N7	*Gleditsia triacanthos*	gleditzja trójcierniowa	16	–	2,5	–	drzewo młode, zdrowe	**nie**	0%	nie	nie	monitoring
N8	*Cotoneaster sp.*	irga	-	-	5	20	krzew zdrowy, o płożących się pędach	**nie**	0%	nie	nie	monitoring