

Nakło nad Notecią, dnia 29.06.2020 r.

PLAN ODNOWIENIA LASU

Właściciel: Gmina Nakło nad Notecią
zam. ul. K. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

Lokalizacja powierzchni leśnej do odnowienia:

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: nakielski

Gmina: Nakło nad Notecią

Obręb ewidencyjny: Patelek

Dz. nr: 381/2

Powierzchnia do odnowienia ogółem: 0,07 ha

Powierzchnia do odnowienia w poszczególnych wydzieleniach:

Oddział i pododdział	1h					
Powierzchnia do odnowienia (ha)	0,07					
Typ siedliskowy lasu	B _{sw}					
Typ drzewostanu	So					

Kraina III Wielkopolsko-Pomorska

Procentowy udział gatunków do odnowienia wg ZHL - Tabela Nr 3 dla Krainy III
Wielkopolsko-Pomorskiej:

Typ siedliskowy lasu	Typ drzewostanu gatunki główne	Gatunki domieszkowe uszlachetniające	Gatunki domieszkowe pomocnicze	Przykładowy skład gatunkowy odnowienia
1	2	3	4	5
B _{sw}	So	—	K, J ₁₂ i inne	So 80 B ₂ 20

1. Przyjęty skład gatunkowy:

So - 80%
Bz - 20%

2. Powierzchnie wg. przyjętego składu gatunkowego:

So - 0,06 ha
Bz - 0,01 ha

3. Ilości sadzonek wg ZHL - Tabela Nr 4:

So - 0,5 tys / sztuk
Bz - 0,1 tys / sztuk

4. Wieżba sadzenia:

So - 1,5 m x 0,8 m
Bz - 1,5 m x 1,2 m

5. Sadzonki:

Sosna zwyczajna	- 1/0 lub 2/0 I klasy jakości z regionu nasiennego So 30
Brzoza brodawkowata	- 2/0 I klasy jakości
Dąb bezszypułkowy	- 2/0 I klasy jakości
Modrzew europejski	- 2/0 I klasy jakości
Świerk pospolity	- 2/0 I klasy jakości
Buk pospolity	- 2/0 I klasy jakości

Opis zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych przewidzianych do przeprowadzenia na uprawie leśnej:

Czynności związane z odnowieniem

1. Sposób przygotowania gleby

Wyoranie pasów pługiem leśnym LPZ w rozstawie co 1,5 m, na jesieni poprzedzającej wiosenne nasadzenia. Na glebach zwięzłych z wyraźną warstwą płuźną i na glebach z rudawcem zastosować orkę z pogłębiaczem.

2. Sposób wykonania odnowienia

Szczególną uwagę należy zwrócić na transport i przechowywanie sadzonek. Nienależycie zabezpieczone sadzonki mogą ulec przesuszeniu w bardzo krótkim czasie. System korzeniowy jest niezwykle wrażliwy pod tym względem.

Na miejscu rozładunku należy przygotować możliwie w zacienieniu dół o głębokości 0,5 m, szerokości 1,5 m i długości wg potrzeb. Sadzonki w dole układać cienkimi warstwami. Korzenie każdej warstwy przysypać wilgotną ziemią powyżej szyjki korzeniowej. Po wypełnieniu dołu przykryć go gałęziami sosny lub jałowca.

Sadzenie należy wykonać zgodnie ze szkicem planu odnowienia i podanymi więźbami dla poszczególnych gatunków. Sadzenie jednorocznej sosny należy wykonać w szparę pod kostur. Sadzenie wieloletnich iglastych i liściastych wykonujemy w jamkę pod szpadel. Należy zwracać szczególną uwagę, by nie podwijać systemu korzeniowego sadzonek. Po umieszczeniu sadzonki w jamce przysypać ją ziemią i dobrze docisnąć nogami. W czasie sadzenia sadzonki nosimy w pojemnikach.

Prace związane z sadzeniem należy zakończyć do 30 kwietnia danego roku.

3. Poprawki

Poprawki wykonujemy w miejscach wypadu sadzonek. Jesienią poprzedzającą poprawki dokonujemy oceny udatności upraw w celu stwierdzenia ilości wypadów, oraz przygotowujemy glebę poprzez zdarcie pokrywy gleby w talerze o wymiarach 60 x 60 cm wraz ze spulchnieniem (przekopaniem) gleby w miejscu sadzenia. Poprawki wykonujemy wczesną wiosną, by wykorzystać maksymalnie istniejącą w glebie wilgoć. Najskuteczniejsze będą poprawki wykonane w pierwszym roku po założeniu uprawy. Do poprawek używamy sadzonek tych gatunków, które wypadły.

4. Pielęgnowanie gleby - niszczenie chwastów

Niszczenie chwastów wykonujemy w pierwszych trzech latach istnienia uprawy. Chwasty niszczymy poprzez ich wykaszanie na międzyrzędach wykaszarkami na wysięgnikach, kosami leśnymi lub sierpami. Przy wykaszaniu należy pamiętać, by zniszczone chwasty nie leżały na drzewkach i ich nie przygniatały.

Do wykaszania należy przystąpić przed ich kwitnieniem (najczęściej pod koniec maja). W zależności od potrzeb czynność tę należy powtórzyć w miesiącu sierpniu. Wysokie i uciążliwe chwasty, które na pewnych fragmentach uprawy pozostaną w okresie jesiennym należy bezwzględnie wykosić przed zimą, aby obfite opady śniegu nie przygmiotły chwastów, a te drzewek.

5. Czyszczenia wczesne

Czyszczenia wczesne należy przeprowadzić w momencie, kiedy sadzonki w rzędach osiągnęły zwarcie, a nie osiągnęły go jeszcze między rzędami, czyli około piątego roku życia uprawy.

Czyszczenia wczesne są zabiegiem polegającym na usuwaniu lub hamowaniu wzrostu zbędnych domieszek, które gęszą drzewka należące do gatunków głównych lub pożądanых domieszkowych, łagodzenie różnic wysokości drzewek na granicy grup lub kęp różniących się między sobą składem gatunkowym, usuwanie drzewek wadliwych, przerostów i przedrostów, obumarłych i chorych. Wycięte drzewka pozostawiamy na międzyrzędach w uprawie na leżąco.

6. Wskazane zabiegi ochronne

a) zabezpieczenie uprawy przed zwierzyną poprzez:

- smarowanie sadzonek repelentami mającymi atest Instytutu Badawczego Leśnictwa
- grodzenie uprawy żerdziami lub siatką

a) dokonywanie okresowej oceny stanu zdrowotnego uprawy

Ocenę taką przeprowadza się wiosną by w porę zlikwidować pierwotne ogniska infekcji drzewek przez grzyby powodujące choroby systemów korzeniowych, tj. korzeniowiec wieloletni, opieńka miodowa i huba korzeni.

W przypadku stwierdzenia występowania tych grzybów, porażone drzewka należy wyrwać z korzeniami i spalić.

b) zagrożenie ze strony szkodników owadzych

W przypadku stwierdzenia masowego pojawienia się szkodliwych owadów należy niezwłocznie powiadomić pracownika ds. lasów niepaństwowych w celu rozpoznania gatunku szkodnika i zastosowaniu odpowiedniej metody zwalczającej.

W załączniku:

- szkic planu odnowienia

INSPEKTOR
Inż. Sebastian Łabich

(sporządził)