
	SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
EDYCJA: 3	I-304-018
STRONA: 1/5	IZOLACJA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Opracował:		Data 19.09.2022	podpis	Rok edycji 2019
Sprawdził:		Data 19.09.2022	podpis	
Zatwierdził:		Data 19.09.2022	podpis	

Tabela zmian w dokumencie Systemu Zarządzania Jakością			
Nr edycji/ wersji	Data	Typ zmiany	Zatwierdził/ wprowadził
2/1	11.12.2013	Zmiana nazwy podmiotu leczniczego	
2/2	08.06.2015	Uszczegółowiono sposób postępowania z brudną bielizną	
2/2	11.04.2019	Rewizja instrukcji na dzień 11.04.2019. Instrukcja nie wymaga zmian	
3/1	19.09.2022	Dodanie nowego załącznik do instrukcji Z-304-018-001	
3/1	16.11.2022	Rewizja instrukcji na dzień 16.11.2022. Treść instrukcji nie uległa zmianie	

Uwaga: Niniejszy dokument stanowi własność Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka Inowrocławiu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody wydawcy.

	SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
EDYCJA: 3	I-304-018
STRONA: 2/5	IZOLACJA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

1. Cel

Cel izolacji :

- zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń
- izolowanie źródła infekcji
- przerwanie dróg przenoszenia zakażeń

2. Zakres


Oddziały szpitala

3. Sposób realizacji


W przypadku wyhodowania *Clostridium difficile* należy niezwłocznie wdrożyć izolację kontaktową. Pacjent powinien być izolowany na okres do ok. 48 godz. od ustąpienia biegunki i uzyskania uformowanego stolca.

Ponieważ toksyna w kale może być wykrywana również u osób, u których objawy już ustąpiły, to w przypadku prawdopodobnego pojawienia się szczepów hiperepidemicznych łatwo rozprzestrzeniających się w oddziale, należy rozważyć izolację pacjenta przez cały okres hospitalizacji.


POMIESZCZENIE	<p>Pacjenta umieścić w jednoosobowej sali z wydzieloną toaletą.</p> <p>W sali musi znajdować się dozownik z mydłem, środkiem dezynfekcyjnym do rąk mydłem oraz podajnik z jednorazowymi ręcznikami.</p> <p>Drzwi sali oznaczyć symbolem izolacji.</p> <p>Dopuszczona jest kohortacja pacjentów z <i>Clostridium difficile</i>.</p>
PERSONEL MEDYCZNY	<p>Personel zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad izolacji</p>
WIZYTA LEKARSKA	<ul style="list-style-type: none"> - Do pacjenta izolowanego należy wchodzić w ostatniej kolejności. - Liczba osób wchodzących do sali ograniczona do niezbędnego minimum - Przed wejściem na salę należy założyć jednorazowy fartuch i rękawiczki - Po badaniu pacjenta przed opuszczeniem sali chorego należy bezwzględnie umyć!!! i zdezynfekować ręce!

	SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
EDYCJA: 3	I-304-018
STRONA: 3/5	IZOLACJA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

HIGIENICZNE MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK	<ul style="list-style-type: none"> - ręce należy <u>umyć</u> i zdezynfekować po każdym kontakcie z pacjentem, kontakcie z potencjalnie skażonymi przedmiotami - po zdjęciu rękawiczek - przed opuszczeniem sali chorego <p>UWAGA:</p> <p>Sama dezynfekcja rąk – bez uprzedniego mycia nie jest wystarczająca (preparaty dezynfekcyjne na bazie alkoholu nie działają skutecznie na spory). Należy zwrócić uwagę na dokładne mycie rąk!!!</p>
OCHRONA OCZU MASKI	<p>Nie są konieczne.</p>
OCHRANIACZE NA OBUWIE	<p>Nie są zalecane</p>
SPRZĘT I MATERIAŁ MEDYCZNY I NIEMEDYCZNY	<ul style="list-style-type: none"> - Wydzielony tylko dla pacjenta w izolatce np. aparaty do mierzenia ciśnienia, stetoskop, termometr, basen, miska - Kremy, żele, krople wydzielone dla pacjenta - na sali przechowywać sprzęt niezbędny, bez zapasów
BIELIZNA POŚCIELOWA	<ul style="list-style-type: none"> - Bieliznę pościelową oraz bieliznę chorego zmieniać codziennie oraz każdorazowo przy zanieczyszczeniu. - Po użyciu wrzucić do czerwonego foliowego worka i szczelnie zamknąć! - Zamknięty worek należy włożyć do drugiego, czystego i opisać „Uwaga. Bielizna skażona” - Nie ubijać bielizny w workach - Po zamknięciu worek należy przekazać do brudownika, gdzie jest przechowywany do czasu przetransportowania do pralni - W przypadku dużej ilości skażonej bielizny należy zgłosić dodatkowy transport bielizny do pralni (poza ustalonymi godzinami)
ODPADY MEDYCZNE	<ul style="list-style-type: none"> - Wrzucać do pojemnika zamykanego pedałem nożnym, wyłożonego czerwonym workiem. - worki z odpadami muszą być szczelnie zamknięte (związane) przed wyniesieniem z sali chorych!

	SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
EDYCJA: 3	I-304-018
STRONA: 4/5	IZOLACJA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

	- worki należy opisać: kod 180103, oddział z którego pochodzą odpady i data zamknięcia worka.
NACZYNIA I SZTUĆCE	- stosować jednorazowego użycia, po wykorzystaniu wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na odpady zakażne.
TRANSPORT CHOREGO	- Ograniczyć do minimum. Poinformować o istniejącym zakażeniu/ podejrzeniu zakażenia personel docelowego oddziału lub pracowni. - wózek transportowy zdezynfekować preparatem wykazującym działanie sporobójcze
SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY	- używać specjalnego wydzielonego wózka do sprzątnia - dezynfekcja przez zmywanie wszystkich powierzchni przynajmniej 2x dziennie. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego używać preparatu wykazującego działanie sporobójcze. - ściereczki do dezynfekcji używać tylko 1 raz, następnie wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na odpady medyczne –zakażne.
SPRZĘT HIGIENICZNY	- miski, baseny, kaczki, nerki wielorazowe muszą być wydzielone dla izolowanego pacjenta przez cały czas izolacji UWAGA: Každorazowo przed umieszczeniem sprzętu sanitarnego w myjni – dezynfektorze , przeprowadzić dezynfekcję wstępną - wózek serwisowy po sprzątnięciu najpierw zdezynfekować, a następnie umyć.
TRANSPORT CHOREGO	- ograniczyć do minimum - poinformować o istniejącym zakażeniu personelu docelowego oddziału lub pracowni - wózek transportowy po użyciu zdezynfekować preparatem wykazującym działanie sporobójcze.
IZOLOWANY PACJENT	- pacjenta poinformować o konieczności przestrzegania zasad higieny – mycia rąk, szczególnie po każdym wyjściu z toalety

	SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
EDYCJA: 3	I-304-018
STRONA: 5/5	IZOLACJA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

ROZPRYŚNIĘTA TREŚĆ KAŁOWA	- natychmiast zebrać ręcznikami jednorazowego użycia - zanieczyszczone miejsce zdezynfekować roztworem dezynfekcyjnym o szerokim spectrum działania posiadającym działanie sporobójcze.
UWAGA	- odpowiednim materiałem do wykonania badań w kierunku Clostridium difficile jest luźny, wodnisty kał biegunkowy – szybko dostarczony do laboratorium

4. Odpowiedzialność

4.1. Koordynator/Ordynator/ Kierownik Komórki Organizacyjnej:

- w zakresie nadzoru i właściwego stosowania instrukcji

4.2. Pielęgniarka Oddziałowa:

- w zakresie nadzoru i właściwego stosowania instrukcji

4.3. Pielęgniarka/ Inny personel:

- właściwe zastosowanie instrukcji

5. Formularze/załączniki

Z-304-018-001 – Informacja dla pacjenta z Clostridium difficile